

Листок-вкладыш

Следует внимательно прочитать весь листок-вкладыш, поскольку он содержит важную для пациента информацию.

Боботик

Торговое название лекарственного средства

Боботик

Международное непатентованное название лекарственного средства

Симетикон

Лекарственная форма

Капли для приема внутрь

Состав

Действующее

вещество: симетикон (диметикон активированный двуокисью кремния) 66,66 мг/мл

Вспомогательные вещества: натрия сахаринат (Е 954), метилпарагидроксибензоат (Е 218), пропилпарагидроксибензоат (Е 216), кармеллоза натрия, лимонной кислоты моногидрат (Е 330), ароматизатор малиновый, вода очищенная.

Описание

Густая, непрозрачная жидкость белого или почти белого цвета с фруктовым запахом.

Название и адрес производителя

Медана Фарма АО

98-200 Серадз

ул. В. Локетка 10

Польша

Фармакотерапевтическая группа

Прочие средства для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта. Код АТХ: А 03 АХ 13.

Показания к применению

- Для симптоматического лечения при нарушениях со стороны желудочно-кишечного тракта, вызванных повышенным газообразованием, например, при метеоризме, при колике у младенцев (трехмесячные колики).
- В рамках подготовки к эндоскопическим, ультразвуковым или радиологическим исследованиям желудочно-кишечного тракта.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к симетикону или к какому-либо вспомогательному веществу
- Кишечная непроходимость
- Обструктивные заболевания ЖКТ
- Детский возраст до 28 дней

Взаимодействия с другими лекарственными средствами

Из некоторых сообщений следует, что симетикон может нарушать всасывание пероральных антикоагулянтов. Применение симетикона может давать ложноположительные результаты диагностических тестов с применением гваяковой смолы, однако не влияет на результаты быстрого уреазного теста (диагностика *Helicobacter pylori*).

Особые указания и меры предосторожности при применении

При применении лекарственного препарата Боботик не следует употреблять газированную жидкость.

Лекарственный препарат содержит метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат, что может вызывать аллергические реакции (возможны реакции замедленного типа).

Беременность и лактация

Применение при беременности и кормлении грудью возможно, если, по мнению врача польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Влияние на способность к вождению транспортных средств и управлению механизмами.

Не влияет.

Способ применения и дозы

Внутрь.

Перед употреблением флакон необходимо активно встряхнуть до получения однородной жидкости.

Для точного дозирования препарата во время отсчитывания капель флакон следует держать вертикально.

Усиленное газообразование и накопление газов в области ЖКТ:

Боботик обычно применяется после еды три раза в день и перед сном:

- дети с младенческого возраста до 3 лет по 8 капель (20 мг симетикона) 4 раза в сутки
- дети от 3 до 6 лет по 14 капель (35 мг симетикона) 4 раза в сутки
- дети старше 6 лет и взрослые по 16 капель (40 мг симетикона) 4 раза в сутки

Для более удобного применения препарата, в частности маленьким детям, его можно предварительно смешать с небольшим количеством кипяченой остывшей воды, детского питания, либо негазированной жидкости.


Лечение продолжать до исчезновения недомаганий.

Подготовка к диагностическим процедурам:

Рентгенографическое исследование ЖКТ;

За один день до исследования следует принять утром и вечером дозу:

- дети с младенческого возраста до 3 лет по 10 капель (25 мг симетикона) 2 раза в сутки



- дети от 3 до 6 лет по 16 капель (40 мг симетикона) 2 раза в сутки
- дети старше 6 лет и взрослые по 20 капель (50 мг симетикона) 2 раза в сутки

Сонографическое исследование ЖКТ:

За один день до исследования следует принять утром и вечером (в зависимости от возраста) такое же количество препарата, как при подготовке к рентгенографическому исследованию.

За три часа до начала исследования дозу повторить.

Открытый флакон следует использовать в течение 2 месяцев.

Передозировка

Препарат химически инертен и не всасывается из ЖКТ, до настоящего времени сведений о передозировке Боботика нет.

Побочное действие

В исследованиях не сообщалось о нежелательных эффектах, связанных с применением препарата Боботик.

О появлении всех побочных (необычных) эффектов, в том числе не указанных в листке-вкладыше, необходимо сообщить лечащему врачу.

Срок годности

3 года

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 15°C до 25°C.

Лекарственное средство следует хранить в местах недоступных для детей.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Упаковка

По 30 мл во флаконы темного стекла с полиэтиленовой пробкой-капельницей и завинчивающейся полиэтиленовой крышкой.

Флакон, снабженный этикеткой и листком-вкладышем, помещают в индивидуальные картонные коробки.

